







TABLA DE DOSIS



Antimicrobianos

Celesporin (Cefalexina)	
150 mg 1 comp./5 kg BID → 7 días	
600 mg 1 comp./20 kg BID → 7 días	
Doxifin Tabs (Doxiciclina)	
50 mg 1 comp./5 kg SID → 7 días Erlíquiosis: mínimo 28 días	
100 mg 1 comp./10 kg SID → 7 días Erlíquiosis: mínimo 28 días	
200 mg 1 comp./20 kg SID → 7 días Erlíquiosis: mínimo 28 días	
Quinotrat Tabs (Enrofloxacin)	
25 mg 1 comp./5 kg SID → 3 a 5 días	
100 mg 1 comp./20 kg SID → 3 a 5 días	
200 mg 1 comp./40 kg SID → 3 a 5 días	
Trissulfín SID (Sulfadimetoxina/Ormetoprim)	
400 mg 1 ^{er} día: 2 comp./5 kg SID 2 ^{do} día: 1 comp./5 kg SID → 3 a 21 días Isosporosis: 1 comp./2 kg SID → 5 a 14 días	
1600 mg 1 ^{er} día: 2 comp./20 kg SID 2 ^{do} día: 1 comp./20 kg SID → 3 a 21 días Isosporosis: 1 comp./8 kg SID → 5 a 14 días	
Zitrocox - 2 (Azitromicina/Meloxicam)	
50 mg 1 ^{er} día: 2 comp./5 kg SID 2 ^{do} día: 1 comp./5 kg SID → 3 a 5 días	
200 mg 1 ^{er} día: 2 comp./20 kg SID 2 ^{do} día: 1 comp./20 kg SID → 3 a 5 días	

Antiinflamatorios

Meloxifin Comprimidos (Meloxicam)	
Perros: 0,5 mg 1 ^{er} día: 2 comp./5 kg SID 2 ^{do} día: 1 comp./5 kg SID → 5 a 7 días	
2,0 mg 1 ^{er} día: 2 comp./20 kg SID 2 ^{do} día: 1 comp./20 kg SID → 5 a 7 días Hasta 28 días: cuadros crónicos.	
Gatos: 0,5 mg 1 comp./5 kg → Hasta 4 días	
Meloxifin 0,2% Solución inyectable (Meloxicam)	
1 ^{er} día: 1 mL/10 kg SID IV/SC/IM 2 ^{do} día: 0,5 mL/10 kg SID IV/SC/IM	
Meloxifin Premium (Meloxicam/Sulfato de Condroitina A)	
Perros: 0,5 mg 1 ^{er} día: 2 comp./5 kg SID 2 ^{do} día: 1 comp./5 kg SID → 5 a 7 días	
2,0 mg 1 ^{er} día: 2 comp./20 kg SID 2 ^{do} día: 1 comp./20 kg SID → 5 a 7 días Hasta 28 días: cuadros crónicos.	
Gatos: 0,5 mg 1 comp./5 kg → Hasta 4 días	
Predicorten Comprimidos (Prednisolona)	
5 mg 1 comp./5 a 10 kg SID o BID 20 mg 1 comp./20 a 40 kg SID o BID	


Dermatológicos

Dermolene Crema (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)	
7 - 10 días/Afecciones fúngicas → Hasta 4 semanas	
Regepil (Tartarato de Ketanserina/Asiaticosideo)	
Aplicar en el área de la herida 3 veces al día hasta la curación completa. No aplicar en heridas sangrantes	

Otológicos

Otogen (Gentamicina/Betametasona/Miconazol)	
Hasta 15 kg - 4 gotas BID → 7 a 9 días Arriba de 15 kg - 8 gotas BID → 7 a 9 días	
Auritop (Ciprofloxacina/Ketoconazol/Fluocinolona/Lidocaina)	
Perros Hasta 15 kg - 4 gotas BID → 7 a 10 días Arriba de 15 kg - 8 gotas BID → 7 a 10 días Gatos 3 gotas BID → 7 a 10 días	

Suplementos

Petcell (Ácido Fólico, Vitaminas B2, B6, B12, C, K3, Cobalto, Cobre, Hierro, Zinc, Azúcar Fructosa y Sorbitol)	
Perros y Gatos 1 mL/10 kg BID → 15 a 30 días	
Aves y Roedores 2 mL diluidos en 1 L de agua → 15 a 30 días	

Protección

FRONPet (Fipronil 12,5%)



Perros	Hasta 10 kg - 0,67 mL → aplicar cada 30 días
	10,1 a 20 kg - 1,34 mL → aplicar cada 30 días
	20,1 a 40 kg - 2,68 mL → aplicar cada 30 días
	Superior a 40 kg - 4,02 mL → aplicar cada 30 días
Gatos	Hasta 8 kg - 0,32 mL → aplicar cada 30 días

Leevre (Deltametrina 4%/Propoxur 12%)



Collar - 48 cm | Perros de tamaño pequeño a mediano.
Collar - 63 cm | Perros de tamaño grande

Se sugiere el cambio del collar cada 6 meses como mínimo.

Endog (Prazicuantel/Pamoato de Pirantel/Febantel/Ivermectina)



250 mg	1 comp. por cada 2,5 kg
1000 mg	1 comp. por cada 10 kg
3000 mg	1 comp. por cada 30 kg

Se recomienda una dosis de refuerzo después de 15 días.
Giardiasis: 3 días consecutivos

Herbalvet T.A. (Cloruro de Benzalconio al 15%)

Diluir 1 mL en 500 mL de agua (10 mL en 5 litros de agua)

Limp & Hidrat (Extracto de Aloe Vera/Extracto de Tilia/ Saponinas vegetales/Aceite esencial de Lavanda)



Se recomienda la limpieza de los oídos 1 vez a la semana.

SID = 1 vez al día.

BID = 2 veces al día.

Venta bajo receta y administración bajo orientación del médico veterinario.

Consulte siempre el prospecto.